

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

# MUSCORIL DOLORE

## 20 mg/g gel



Per adulti e adolescenti di età pari o superiore a 14 anni  
Diclofenac, corrispondente a diclofenac sodico (come diclofenac dietilammina)



Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.  
Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le hanno detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, inclusi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 3-5 giorni.



### Contenuto di questo foglio

1. Cos'è MUSCORIL DOLORE e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare MUSCORIL DOLORE
3. Come usare MUSCORIL DOLORE
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare MUSCORIL DOLORE
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

### 1. Cos'è MUSCORIL DOLORE e a cosa serve

MUSCORIL DOLORE contiene il principio attivo diclofenac che appartiene ad una classe di medicinali detti farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).

MUSCORIL DOLORE è indicato

#### Per adulti e adolescenti di età pari o superiore a 14 anni

Per il trattamento sintomatico locale del dolore associato a stiramenti muscolari acuti, distorsioni o contusioni a seguito di traumi da impatto, ad esempio infortuni e incidenti sportivi.

Per gli adolescenti di età pari o superiore a 14 anni il medicinale è indicato per il trattamento a breve termine.

### 2. Cosa deve sapere prima di usare MUSCORIL DOLORE

#### Non usi MUSCORIL DOLORE

- se è allergico al diclofenac o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se ha sviluppato attacchi di asma, orticaria, naso che cola (rinite acuta) dopo l'assunzione di acido acetilsalicilico o di altri farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS);
- su ferite aperte, infiammazioni o infezioni della pelle, su eczemi o su mucose;
- se è negli ultimi 3 mesi di gravidanza (vedere "Gravidanza e allattamento");
- in bambini e adolescenti al di sotto dei 14 anni.

#### Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare MUSCORIL DOLORE.

Se soffre di asma, rinite allergica, gonfiore della mucosa nasale (i cosiddetti polipi nasali) o di broncopneumopatia cronica ostruttiva, infezioni croniche delle vie respiratorie (associate in particolare a sintomi simili alla rinite allergica), lei è più esposto, rispetto ad altri pazienti, ad attacchi d'asma (la cosiddetta intolleranza agli analgesici/asma analgesico), gonfiore locale della pelle o delle mucose (il cosiddetto edema di Quincke) ed orticaria.

In questi pazienti, MUSCORIL DOLORE può essere usato soltanto con determinate precauzioni (preparazione alle emergenze) e sotto diretto controllo medico. Lo stesso vale per i pazienti che sono allergici anche ad altre sostanze e manifestano, ad esempio, reazioni cutanee, prurito o orticaria.

Quando MUSCORIL DOLORE viene applicato su un'area di pelle estesa e per un periodo prolungato, non si può escludere la possibilità di effetti indesiderati sistematici associati all'applicazione di MUSCORIL DOLORE.

Applich MUSCORIL DOLORE soltanto sulla pelle intatta, sana e priva di ferite. Eviti il contatto con gli occhi e con le mucose orali. Il gel non deve essere ingerito.

Dopo aver applicato il gel sulla pelle si può utilizzare un bendaggio traspirante (non occlusivo), ma occorre prima lasciar asciugare il gel sulla pelle per qualche minuto. Non lo utilizzi con bendaggi occlusivi che non lasciano passare l'aria.

Consulti il medico se i sintomi peggiorano o non migliorano entro 3-5 giorni.

L'uso di MUSCORIL DOLORE deve essere interrotto se sviluppa un'eruzione cutanea.

Eviti l'esposizione alla luce del sole, comprese le lampade solari, durante l'uso di questo medicinale.

Occorre adottare le necessarie precauzioni per impedire ai bambini di toccare l'area sulla quale è applicato il gel.

#### Bambini e adolescenti

MUSCORIL DOLORE è controindicato nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 14 anni.

#### Altri medicinali e MUSCORIL DOLORE

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale, inclusi quelli senza obbligo di prescrizione.

Ad oggi non sono note interazioni associate all'uso cutaneo previsto di MUSCORIL DOLORE.

#### Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

#### Gravidanza

Non usi MUSCORIL DOLORE se è negli ultimi 3 mesi di gravidanza. Non usi MUSCORIL DOLORE durante i primi 6 mesi di gravidanza se non strettamente necessario e su indicazione del medico. In caso di necessità di trattamento durante tale periodo, deve essere usata la dose più bassa per il tempo più breve possibile.

Le forme orali (ad es. compresse) di diclofenac possono causare effetti avversi nel nascituro. Non è noto se lo stesso rischio si presenta con MUSCORIL DOLORE quando viene utilizzato sulla pelle.

#### Allattamento

Piccole quantità di diclofenac sono escrete nel latte materno.

Si rivolga al medico prima di usare MUSCORIL DOLORE durante l'allattamento. In ogni caso, se sta allattando, non applichi MUSCORIL DOLORE direttamente sul seno né altrove su ampie aree di pelle o per un periodo di tempo prolungato (vedere paragrafo 2 "Avvertenze e precauzioni").

#### Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

MUSCORIL DOLORE non altera o altera in maniera trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

#### MUSCORIL DOLORE contiene glicole propilenico (E1520), butilidrossitoluene (E 321) e un profumo con limonene

Questo medicinale contiene 60 mg di glicole propilenico in ciascun g di gel.

Questo medicinale contiene il butilidrossitoluene (E 321) che può provocare reazioni cutanee locali (ad esempio, dermatite da contatto) o irritazione agli occhi e alle mucose.

Questo medicinale contiene un aroma con limonene, che può causare reazioni allergiche.

#### 3. Come usare MUSCORIL DOLORE

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

#### Uso in adulti e adolescenti di età pari o superiore a 14 anni

In base alla dimensione della zona interessata da trattare, deve essere applicata una quantità di gel variabile tra una ciliegia a una noce, corrispondente a 1-4 g di gel.

MUSCORIL DOLORE deve essere applicato due volte al giorno (preferibilmente al mattino e alla sera).

La dose massima giornaliera è di 8 g di gel.

#### Uso in pazienti anziani

Non sono necessari speciali aggiustamenti della dose. Se lei è anziano, deve prestare particolare attenzione agli effetti indesiderati e, se necessario, deve consultare il medico o il farmacista.

## BIANCA/FRONT

ARTWORK PDF 1.5

PRODUCT CODE:  
**F1A7004\_2ED**

PRODUCT NAME:

**INS Muscoril Dolore**  
**20 mg/g gel**

SEPARATIONS:

● BLACK

MEASURES (mm): 160 x 305

FONT: Frutiger LT Std 7 pt

PRODUTTORE: EPFARMA/MIPHARM

CLASSE TERAPEUTICA: MUSCOLO SCHELETICO

2D CODE: 934280

**DOC**  
**GENERICI**

DATE

OPERATOR

DRAFT

10/01/2025

RIO07M

01

Revised by:  
PACKAGING DEVELOPMENT CENTER  
**EURPACK®**  
premedia@eurpack.it

**Uso nella compromissione della funzionalità epatica o renale**  
Non sono necessarie riduzioni della dose.

**Uso nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 14 anni**  
MUSCORIL DOLORE è controindicato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 14 anni (vedere paragrafo 2 "Non usi MUSCORIL DOLORE").

**Adolescenti di età pari o superiore a 14 anni**

Se questo medicinale è necessario per più di 7 giorni per il trattamento del dolore o se i sintomi peggiorano si consiglia al paziente/ai genitori dell'adolescente di consultare il medico.

**Modo di somministrazione**

MUSCORIL DOLORE è per uso cutaneo.

Applichi un sottile strato di MUSCORIL DOLORE sulle parti del corpo interessate e massaggi delicatamente sulla pelle. Successivamente, pulisca le mani con un tovagliolo di carta e poi le lavi, a meno che non siano la zona da trattare.

Se viene applicata accidentalmente una quantità eccessiva di gel, l'eccesso di gel deve essere pulito con un tovagliolo di carta.

Il tovagliolo di carta deve essere smaltito nei rifiuti domestici per evitare che il prodotto non utilizzato raggiunga l'ambiente acquatico.

Prima di applicare un bendaggio, il gel deve essere lasciato asciugare per qualche minuto sulla pelle. Inoltre, prima di fare la doccia o il bagno, attendere che il gel si sia asciugato sulla pelle.

Come rimuovere il sigillo al primo utilizzo:

- Svitile tolga il tappo
- Utilizzzi la parte posteriore del tappo per rimuovere il sigillo di sicurezza del tubo

**Durata del trattamento**

La durata del trattamento dipende dall'indicazione e dalla risposta del paziente. MUSCORIL DOLORE non deve essere usato per più di 1 – 2 settimane senza consultare il medico. Se i sintomi peggiorano o non migliorano dopo 3 – 5 giorni, consulti il medico.

**Se usa più MUSCORIL DOLORE di quanto deve**

E improbabile che si verifichino un sovradosaggio, dal momento che l'assorbimento nel flusso sanguigno è scarso quando il medicinale è usato solamente sulla pelle. Se si applica sulla pelle una dose significativamente superiore a quella consigliata, è necessario rimuovere il gel (ad esempio con un tovagliolo di carta) e sciacquare l'area con acqua.

In caso di ingestione accidentale di MUSCORIL DOLORE, contatti immediatamente il medico o si rechi al pronto soccorso dell'ospedale più vicino.

Se ingerisce accidentalmente il contenuto di un tubo di MUSCORIL DOLORE potrebbero verificarsi effetti indesiderati simili a quelli osservati dopo l'ingestione di una dose eccessiva di diclofenac per uso sistemico.

**Se dimentica di usare MUSCORIL DOLORE**

Non usi una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

**4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

I seguenti effetti indesiderati possono essere gravi. Smetta di usare MUSCORIL DOLORE e si rivolga immediatamente al medico:

- Infiammazione della pelle con vesciche (dermatite bollosa)

Effetti indesiderati molto rari (possono interessare fino a 1 persona su 10.000)

- Asma

• Gonfiore di viso, labbra, lingua o gola (angioedema)

**È possibile che si verifichino altri effetti indesiderati:**

**Comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10)**

• Eruzione cutanea, arrossamento della pelle (eritema), dermatite (compresa dermatite da contatto), prurito.

**Non comuni (possono interessare fino a 1 persona su 100)**

• Desquamazione, disidratazione della pelle, edema.

**Molto rari (possono interessare fino a 1 persona su 10.000)**

• Eruzione cutanea con pustole

• Disturbi gastrointestinali

• Reazioni di ipersensibilità, compresa orticaria

• Macchie o arrossamenti cutanei a seguito di esposizione alla luce solare o a lampade solari (reazione di fotosensibilità).

**Frequenza non nota** (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

• Sensazione di bruciore nella sede di applicazione.

Quando MUSCORIL DOLORE viene applicato su un'area di pelle estesa e per un periodo prolungato, non si può escludere la possibilità di effetti indesiderati sistematici (ad esempio, effetti indesiderati renali, epatici o gastrointestinali, reazioni di ipersensibilità sistematica) analoghi a quelli che possono comparire dopo la somministrazione sistematica di medicinali contenenti diclofenac.

**Segnalazione degli effetti indesiderati**

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

**5. Come conservare MUSCORIL DOLORE**

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scad.". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Conservare il medicinale nella confezione originale per proteggerlo dalla luce.

Non refrigerare o congelare.

Dopo la prima apertura, il gel deve essere utilizzato entro 2 anni, ma non oltre la data di scadenza; trascorso tale periodo il gel residuo deve essere eliminato.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

**6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

**Cosa contiene MUSCORIL DOLORE**

- Il principio attivo è diclofenac. 1 g di gel contiene 23,2 mg di diclofenac dietilammina corrispondenti a 20 mg di diclofenac sodico.
- Gli altri componenti sono: dietilammina, carbomero 974P, coccole caprilocapratato, macrogol cetostearile etere, alcol isopropilico, paraffina liquida, glicole propilenico (E 1520), essenza di eucalipto (contiene limonene), butilidrossitoluene (E 321), alcol oleico, acqua depurata.

**Descrizione dell'aspetto di MUSCORIL DOLORE e contenuto della confezione**

MUSCORIL DOLORE è un gel omogeneo, da bianco a quasi bianco.

Ogni confezione contiene un tubo, chiuso con un sigillo e un tappo a vite, da 60 g, 100 g, 120 g o 150 g di gel.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio**

DOC Generici S.r.l. – Via Turati, 40 – 20121 Milano, Italia

**Produttore**

Doppel Farmaceutici S.r.l. – Via Martiri delle Foibe, 1 – 29016 Cortemaggiore (PC), Italia

Mipharm S.p.A. – Via B. Quaranta 12 – 20141 Milano, Italia.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato in Aprile 2025

F1A7004  
934280 IT

**VOLTA/BACK**

ARTWORK PDF 1.5

PRODUCT CODE:  
**F1A7004\_2ED**

PRODUCT NAME:

**INS Muscoril Dolore**  
20 mg/g gel

SEPARATIONS:  
● BLACK

MEASURES (mm): 160 x 305

FONT: Frutiger LT Std 7 pt

PRODUTTORE: EPFARMA/MIPHARM

CLASSE TERAPEUTICA: MUSCOLO SCHELETTRICO

2D CODE: 934280

**DOC  
GENERICI**

DATE

OPERATOR

DRAFT

10/01/2025

RI007M

01

Revised by:  
PACKAGING DEVELOPMENT CENTER  
**EURPACK®**  
premedia@eurpack.it